

UTEC[®] 46

Ureia granulada com o inibidor da urease NBPT

ADUBO CE

UREIA GRANULADA 46 N COM O INIBIDOR DA UREASE (NBPT)

46,0 % Azoto (N) total

46,0 % Azoto (N) amídico

P102 Manter fora do alcance das crianças

P270 Não comer, beber nem fumar durante a sua utilização

Densidade aparente:	0,7 - 0,78 t/m ³
Análise granulométrica:	90% entre 2,0 mm e 5,0 mm
Tamanho médio do grânulo:	3,0-3,6 mm
pH em solução (100g/L, 20 °C)	9,0 – 9,5

Doses orientativas de adubação:

Cultura	Dose (kg/ha)	Época de aplicação
Cereal	200 – 300	Em cobertura, antes do afilamento
Milho	300 – 600	Em cobertura precoce, antes de 3-6 folhas
Arroz	250 - 350	Em fundo e/ou em cobertura
Algodão	100 - 150	Em cobertura
Olival	150 - 200	Em cobertura
Girassol	150 - 200	Em cobertura

Todas estas recomendações são orientativas. Será portanto necessário conhecer previamente a produção esperada, o estado fenológico da cultura, a densidade de plantação,... Além de acompanhar toda esta informação, se possível, com análises de solo, foliar e água de irrigação, a fim de melhor ajustar a nossa recomendação de fertilizantes.

®=Marca registada de EuroChem Agro

Versão: Julho de 2020

Data de impressão: 27. 04 2021

Fabricado por
EuroChem Agro Iberia, S.L.
Tànger 98, EB, 8^a planta
E-08018 Barcelona